

少学组化学期末复习讲座

配合物的结构与命名+结构化学

适用组别：预科二

核心模块：配合物结构命名 — 杂化轨道 — 晶体场理论

题型覆盖：命名题 — 判断题 — 填空题

期末复习专用

目录

1	配合物的结构与命名	2
1.1	核心基本概念（必考）	2
1.2	配合物的命名步骤	2
1.2.1	1. 整体命名规则	2
1.2.2	2. 内界配离子命名规则（核心必背）	2
1.3	命名例题及标准答案	3
2	杂化轨道与空间构型	4
3	配位键类型：内轨配键与外轨配键	4
3.1	1. 内轨/外轨配键核心定义	4
3.2	2. 配位键类型的影响因素	4
4	晶体场理论	5
5	综合练习	5
5.1	一、判断题（对打√，错打×，PPT原版答案）	5
5.2	二、填空题	7

1 配合物的结构与命名

1.1 核心基本概念（必考）

配合物核心需明确六大概念，以 $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ 为例：

1. 外界：与内界以离子键结合的离子，溶于水完全电离；
2. 内界：配位单元，用方括号标注，配合物核心，不电离；
3. 中心离子/原子：接受孤对电子的金属离子/原子，提供空轨道；
4. 配位体（配体）：提供孤对电子的分子/阴离子；
5. 配位原子：配体中直接与中心离子成键的原子；
6. 配位数：中心离子周围直接相连的配位原子总数；
7. 配离子电荷数：中心离子电荷与所有配体电荷的代数和。

1.2 配合物的命名步骤

配合物整体命名与一般无机化合物一致，核心难点为内界配离子，命名分「整体命名」和「内界命名」两步。

1.2.1 1. 整体命名规则

1. 外界为简单离子的酸根（如 Cl^- ）：称某化某；
2. 外界为复杂离子的酸根（如 SO_4^{2-} ）：称某酸某；
3. 外界为氢离子（ H^+ ）：称某酸；
4. 外界为氢氧根离子（ OH^- ）：称氢氧化某。

1.2.2 2. 内界配离子命名规则（核心必背）

按固定顺序命名，不同配体间用「·」隔开，配体个数用「一、二、三」标注：

阴离子配位体 → 中性分子配位体 → 「合」 → 中心离子（罗马数字标氧化数）

补充细则（PPT原版）：

1. 多种阴离子配体：简单离子 → 复杂离子 → 有机酸根离子；
2. 同类配位体：按配位原子元素符号英文字母顺序排序；
3. 氧化数：无变化时可省略，有变化时必须用罗马数字标注；
4. 配体个数：标注在对应配体名称前，不同配体间用「·」分隔。

1.3 命名例题及标准答案

命名下列配位化合物，并指出中心离子、配位体、配位原子、配位数、配离子的电荷数：

表 1: 配合物命名及核心参数表

序号	化学式	命名 (PPT原版)	中心离子/原子	配位原子	配位数	电荷数
1	$\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$	六氰合铁(II)酸亚铁	$\text{Fe}^{2+}(\text{内})/\text{Fe}^{3+}(\text{外})$	C	6	-3
2	$\text{Fe}(\text{CO})_5$	五羰基合铁(0)	Fe(原子)	C	5	0 (中性)
3	$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$	二氯·二氨合铂(II)	Pt^{2+}	N、Cl	4	0 (中性)
4	$\text{K}_2[\text{HgI}_4]$	四碘合汞(II)酸钾	Hg^{2+}	I	4	-2
5	$[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$	氯化一氯·四水合铬(III)	Cr^{3+}	O、Cl	6	+1
6	$\text{K}[\text{Co}(\text{NO}_2)_4(\text{NH}_3)_2]$	四硝基·二氨合钴(III)酸钾	Co^{3+}	N	6	-1
7	$(\text{NH}_4)_2[\text{FeCl}_5(\text{H}_2\text{O})]$	五氯·一水合铁(III)酸铵	Fe^{3+}	O、Cl	6	-2
8	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_2(\text{en})_2](\text{NO}_3)_2$	硝酸二氨·二(乙二胺)合钴(II)	Co^{2+}	N	6	+2

注：PPT原文中 $\text{K}_2[\text{Hg}_4]$ 为笔误，正确为 $\text{K}_2[\text{HgI}_4]$ ； $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$ PPT答案为氯化二氯·四水合铬(III)，为书写笔误，按配位体实际为一氯·四水合铬(III)。

2 杂化轨道与空间构型

配合物的空间构型由中心离子的杂化类型唯一决定，配位数与杂化类型、空间构型一一对应（PPT原版对应表）：

表 2: 配位数-杂化类型-空间构型对应表

配位数	杂化类型	空间构型	典型实例
2	sp	直线形	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$
3	sp^2	平面三角形	$[\text{CuCl}_3]^{2-}$
4	sp^3	正四面体	$[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Co}(\text{SCN})_4]^{2-}$
4	dsp^2	平面正方形	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
5	dsp^3	三角双锥	$[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$ 、 $\text{Fe}(\text{CO})_5$
6	sp^3d^2	正八面体	$[\text{CoF}_6]^{3-}$ 、 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
6	d^2sp^3	正八面体	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

3 配位键类型：内轨配键与外轨配键

配位键根据离子性/共价性占比和杂化轨道来源分为内轨配键（共价配键）和外轨配键（电价配键）。

3.1 1. 内轨/外轨配键核心定义

1. 外轨配键（电价配键）：中心离子与电负性大的配位原子结合，离子性成分大；杂化仅用最外层 ns 、 np 、 nd 轨道，稳定性低。
2. 内轨配键（共价配键）：中心离子与电负性小的配位原子结合，共价性成分大；杂化用次外层 $(n-1)d$ +最外层 ns 、 np 轨道，稳定性高。

3.2 2. 配位键类型的影响因素

配位键类型由中心离子电子构型、中心离子电荷、配位原子电负性共同决定，其中电子构型为决定性因素：

1. 中心离子的电子构型（决定性）

- d^{10} 构型（ Cu^+ 、 Ag^+ 、 Zn^{2+} ）：无空次外层 $(n-1)d$ 轨道，仅能形成外轨型；
- d^8 构型（ Ni^{2+} 、 Pt^{2+} 、 Pd^{2+} ）：次外层 d 轨道饱和，大多形成内轨型；
- $d^4 \sim d^7$ 构型（ Fe^{3+} 、 Co^{2+} ）：内/外轨型均可，由配位原子电负性决定。

2. 中心离子的电荷：电荷数越多，对配体孤电子对引力越强，越易腾出次外层 d 轨道，越易形成内轨型（例： $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 外轨型， $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 内轨型）；

3. 配位原子的电负性

- 电负性大 (F、Cl、O)：易形成外轨型；
- 电负性小 (C、N，如CN⁻、CO)：易形成内轨型。

4 晶体场理论

晶体场理论核心为d轨道的能级分裂，用于解释配合物的高/低自旋、稳定性。

1. 核心：中心离子的d轨道在配体静电场作用下发生能级分裂（原本能量简并的5个d轨道分为能量不同的轨道）；
2. 高/低自旋判断：由轨道分裂能（ Δ ）和电子成对能（ P ）决定， $\Delta < P$ 为高自旋， $\Delta > P$ 为低自旋；
3. 晶体场稳定化能（CFSE）通式（PPT原版）：

$$\text{CFSE} = (-4n_1 + 6n_2)Dq + (m_1 - m_2)P$$

式中： m_1 =八面体场中d轨道成对电子数， m_2 =球形场中d轨道成对电子数， $n_1=t_{2g}$ 轨道电子数， $n_2=e_g$ 轨道电子数；

4. PPT原版实例计算： $n_1 = 6$ 、 $n_2 = 0$ 、 $m_1 - m_2 = 2$ 时， $\text{CFSE} = -24Dq + 2P$ 。

5 综合练习

5.1 一、判断题（对打√，错打×，PPT原版答案）

1. 凡是用 sp^3 杂化轨道成键的分子，其分子构型一定是正四面体。 ×
2. 根据价层电子对互斥理论，AB₂型分子的中心原子A的价层电子对数为2。 ×
3. 一个原子的p轨道与另外一个原子的p轨道重叠成键，一定形成 π 键轨道。 ×
4. C—C单键的键能为348kJ·mol⁻¹，因此C=C双键的键能为696kJ·mol⁻¹。 ×
5. HgCl₂与XeF₂的空间构型均为直线形，表明Hg原子和Xe原子均采用 sp 杂化。 ×
6. 根据分子轨道理论，O₂、O₂⁺、O₂⁻键能的大小顺序为O₂ > O₂⁺ > O₂⁻。 ×
7. 双原子成键，一个原子的2p_x轨道可以与另一个原子的2p_y轨道形成 π 轨道。 ×
8. IF₅分子有6对价层电子对，根据价层电子对互斥理论，该分子结构为八面体。 ×
9. 杂化轨道形成的化学键只能是 σ 键。 ✓
10. 共价键具有方向性和饱和性的特点。 ✓
11. 非极性分子中不会存在极性键。 ×

12. 化学键可以只由 π 键形成。 ×
13. 阴离子易被极化，而阳离子不能被极化。 ×
14. $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 中的配位数为3。 ×
15. 在分子轨道理论中，电子只能排布在成键分子轨道上。 ×

5.2 二、填空题

1. PH_3 分子中, P原子采用 sp^3 杂化, 分子空间构型为**三角锥**; BF_3 分子中, B原子采用 sp^2 杂化, 分子空间构型为**平面三角形**。
2. 采用价层电子对互斥理论判断: SF_6 的分子构型为**正八面体形**; NO_2^- 的分子构型为**V形**; NO^+ 的分子构型为**直线形**; PF_5 的分子构型为**三角双锥形**。
3. 在等性 sp^3 杂化轨道中, s轨道的成分占**1/4**。
4. 下列分子中, 只存在 σ 键的是**(a) NH_3 、(b) CH_4 、(e) CH_3OH** ; 同时存在 σ 键和 π 键的是**(c) CO_2 、(d) O_2** 。
5. 尿素(H_2NCONH_2)分子中C原子的杂化形式为 sp^2 。
6. $\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ 的平面四方形顺反异构体: **顺式**(Cl同侧, $\text{Cl}-\text{Pt}(\text{NH}_3)_2-\text{Cl}$)、**反式**(Cl异侧, $\text{Cl}-\text{Pt}-\text{Cl}(\text{NH}_3)_2$)。
7. $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 中的配位数为**6**, 配体数为**4**; EDTA一个配体可提供**6**个配位原子。
8. 离子键的本质是**静电相互作用**, 其特征是**无方向性、无饱和性**。
9. NO的路易斯电子结构式为: **$\text{N}\equiv\text{O}:$** , 键级为**2.5**。
10. 根据分子轨道理论, N_2 的电子排布为 **$\text{KK}(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\sigma_{2p_x})^2$** 。