

一、八电子规则

用“.”表示一个电子

原子之间失去、得到或共享电子以达到八电子结构

1. 把较低电负性的原子视为中心原子(或族序数较低的)

需要更多电子以达到8电子


以共价键为前提, 有机中讨论离子键

Al原子由于只有一个电子且2电子即不稳定, 故一定在外围

2. 计算总的价电子数, 在画结构式时的检验

3. 画出成键情况

4. 减去成键电子, 补全剩余电子



进入 21 世纪以来, 全球化学发现呈大幅增长趋势, 化合物的种类更以惊人的速度增长。为适应当前学科的发展和我国高等教育改革与人才培养的需要, 受汪小兰教授的委托, 对《有机化学》(第四版) 进行修订。

本次修订, 在保持原书特色与风格的基础上, 结合现代教学的发展与特点进行了适当的修改、删减和调整:

1. 对一些在有机合成中有重要应用的有机反应, 在原反应通式的基础上, 增加了反应实例, 如 Diels-Alder 反应、羰基化合物及羧酸衍生物与格氏试剂等的反应。

2. 根据原书的特色, 鉴于一些有机化合物在生命科学和生活中的重要性, 对合成橡胶、有机磷农药、染料和糖精等内容进行了更新, 增加了对水果催熟剂——乙烯利, 抗氧化剂——BHT 及酚类抗氧化剂的介绍。


3. 增加了有机化学方面具有重要意义的最新进展的介绍, 如石墨烯、青蒿素和不对称合成。

4. 为方便学生检验自己对有机化学知识的理解与掌握, 适当增加了习题的答案与提示。

本次修订得到了汪小兰教授的精心指导; 华南师范大学有机化学研究所全体同事对本次修订提出了许多宝贵的意见与建议; 修订稿经北京师范大学尹冬冬教授审阅, 并提出修改意见, 在此一并表示衷心的感谢。

鉴于本人水平所限, 书中错误和不妥之处, 敬请读者批评指正。

扩展层理论




蒋腊生

2016 年 9 月

二、共振理论 → 无法用单一结构式描述化合物真实结构

臭氧结构(共振式)




共振杂化结构



描述电子领域和参与此领域的电子情况




扫描全能王 创建



共振论认为：不能用经典结构式圆满表示的分子，其真实结构是由多种可能的经典结构式叠加（共振杂化）而成的

共振杂化体是单一物，不是混合物，也不是几种结构的互变平衡

共振式中，只有电子排布不同，原子排列顺序完全相同



共振式中，配对的电子数目和未配对电子数目保持不变

共振杂化体比共振式中任何一个经典结构式都更稳定，共振杂化体的稳定性大小与共振式数目有关。★判断共振杂化体的相对稳定性

1. 在共振式中，若经典结构式的稳定性相同，则形成的共振杂化体往往特别稳定

2. 共振式中，经典结构式越稳定，对共振杂化体的贡献越大（稳定性不同时）

3. 经典结构与共振杂化体结构越接近，参与形成的共振杂化体越稳定

★判断共振式中经典结构式相对稳定性

1. 满足八隅体的经典结构式更稳定

2. 没有正负电荷分离的经典结构式更稳定

3. 共振式中经典结构式越多，参与形成的共振杂化体越稳定

4. 在满足八隅体电子结构但有电荷分离的共振式中，电负性大的原子带负电荷，电负性小的原子带正电荷的经典结构式较不稳定

二. 价键理论 I

分子通过形成共价键，使体系的能量达到最低

★键数越多，两原子间的吸引力越强，键长越短，键能越高

★键能越大，键越牢固

共价化合物沸点一般较低（分子晶体），网状结构熔点较高

★取决于分子间作用力和氢键

化学反应的实质是反应物中化学键的断开和生成物中化学键的形成

化学反应的反应热等于反应物断开的化学键能总和，减去生成物形成化学键的键能总和

键的极性——由于成键原子电负性不同而引起

极性大小取决于

★共价键的可极化性——外电场引起

在外电场作用下，共价键的极性发生变化的相对程度

键的可极化性用极化度衡量，表示成键电子被成键原子核约束的相对程度，与成键原子的体积、电负性、键的种类以及外电场强度有关

★成键原子半径↑可极化性↑



极化性↑ 键能↓ 可极化性↑ 键能↓
 $C-F \quad C-Cl \quad C-Br \quad C-I$
 $\rightarrow$ 极化性↓ 可极化性↑

分子的极性大小通常用好的偶极矩 μ (矢量) 表示

$\mu = q \times d$ q : 正(负)电荷中心的电荷值 d : 正负电荷中心间的距离

三. VSEPR理论


推测分子空间结构使用 $\rightarrow$ 判断反应中断键顺序

NH_3 $N = 5 - 3 = 2$ 有1对孤对电子
 孤对电子排斥力较大




$COCl_2$ 光气 平面三角形

第四版前言



CH_3CH_2OH 乙醇



分子的空间构型, 决定分子间作用力

四. 价键理论

随着化学与相关学科的发展及深化教学改革, 培养高素质人才的需要, 对本书第三版再次进行修订。

此次修订在保留本书原有特色及不增加过多篇幅的原则上, 进行了修改、删减、增加及调整, 并增加了部分习题的参考答案或提示。

鉴于光谱法的应用已非常广泛, 故将“光谱法在有机化学中的应用”一章提前至第七章, 并对内容进行了调整。在该章中, 对红外光谱、紫外光谱及 ^1H 核磁共振谱进行了一般讨论。对羟基、羰基、羧基、氨基等官能团的红外光谱分别在有关章节再作具体讨论以加深印象; 并在这些章中附有习题以巩固所学知识。

随着有机化学学科的发展及生物学科的实际需要, 删去了一些应用已逐渐减少的反应, 增加了一些立体化学的内容。

为适应双语教学的需要, 将有机化学中最基本的名词、术语以及与生物密切相关的化合物等的英文名称, 均附在正文中。并增加了以小字编排的几类主要化合物的最基本的英文命名原则。

为拓宽知识面, 增加了一些近年来有机化学与相关学科间的联系及有机化学在生产与生活中应用方面的内容, 这些内容大都可以自学。

由于有机化学的习题常常不只有一种解法, 故书后所附习题答案仅为参考答案。此次修订对习题作了少量的增删。如果希望做更多的习题, 可以参阅由高等教育出版社出版, 王长凤、曹玉蓉编写的《有机化学例题与习题》第二版。

北京师范大学尹冬冬教授、首都师范大学吴毅为教授、天津师范大学冯金城教授、南开大学曹玉蓉教授等, 对本书的修订提出过许多宝贵的意见与建议; 修订稿经南开大学唐士雄及曹玉蓉二位教授审阅, 并提出修改意见, 在此一并表示衷心的感谢。

书中错误或不妥之处, 恳请读者批评指正。



共价键的形成是两个成键原子的原子轨道相互重叠的结果, 且遵循最大重叠原理

只有自旋方向相反的电子可以成键

每个原子所形成的 σ 键数目取决于该原子的单电子数, 有几个单电子就与几个自旋方

向相反的电子成键, 饱和性

1. 杂化轨道理论 $\rightarrow$ 成键更强, 使分子更稳定
 在有机中主要为 sp 、 sp^2 、 sp^3



2004 年岁末

乙稀 有双键 缺电子 试剂与反应



扫描全能王 创建

π键不能单独存在,必须先有σ键
且π键不能一方单独旋转σ可以 → σ比π更牢固

杂化轨道的数目不同轨道间为使斥力最小,而形成的空间结构决定了分子的空间结构
不同杂化态的C的电负性不同

sp³ sp² sp → 离核更近,吸引更强
电负性 最小 中间 最大

2. 分子轨道(MO)理论

分子中的电子在遍及整个分子的范围内运动


为有效组成分子轨道,原子轨道必须满足三个原则

①对称性匹配 ②能量近似 ③轨道最大重叠


HOMO 能量最高已占轨道 LUMO 能量最低已占轨道

共轭效应: 在共轭体系中,由于相邻P轨道的重叠而使电子间相互流动,使体系能量降低,键长平均化,分子趋于稳定的电子效应 → 三个或以上互相平行的P轨道形成的大π键

电子离域: 共轭体系中,成键电子运动范围扩大的现象,电子离域使共轭体系能量降低



★ 共轭体系的表示及其特点 外电场干扰




①用弯箭头表示由共轭效应引起的电子流动方向

②共轭碳链可产生极性(正电荷交替现象)


③共轭效应不随共轭链增长而减弱

双键也可形成π-π共轭体系,组成共轭体系的原子也不限于C原子,N,O均可





5-元超六元

正建与相邻C-H σ键重叠/相互作用



→ 好较多产生排斥

6-超共轭 → 无需3个及以上中心原子



6键的超共轭

的空轨道或含单电子的p轨道

发生相互作用



第二章：酸与碱

一、阿伦尼乌斯酸碱理论

酸：在水中产生 H^+ 碱：在水中产生 OH^-

二、布朗斯特酸碱理论

本书第一版是为生物系非生化专业编写的，多年来的有机化学教科书，但多年来，第一版及第一版除生物系外，还被许多院校的非生物专业采用，许多院校的老师曾对本书提出过不少很好的建议与意见。




近年来有机化学的发展是惊人的，但作为非化学专业的基础课，只需要掌握有机化学的最基本知识点。此次修订，虽对第二版的内容未做过多的变动，但更新一些知识是必要的。为了基本保持原来的篇幅，根据学科的发展及当前教育教学改革的形势，删去了一些与无机化学重复的内容，或不属于有机化学的基本知识点的内容，或现今已显得有些过时的内容。而对某些理论问题、反应机理等有所修改或加深；用较少的篇幅增加了一些对拓宽知识面可能是有益的内容；对文字叙述进行了全面、仔细的修订；某些化合物的物理性质等，按 The Merck Index 10 th Ed 进行了校正。

由于从生化角度考虑，将第二版中的第十五章及第十六章合并为类脂化合物，基本内容未做变动。

每章之后附有相当数量的习题，难易程度不同，以便根据需要选择。在学习上潜力较大的学生，如希望做更多的习题，可以选用王长风、曹玉蓉编写的《有机化学例题与习题》。

本修订稿经唐士雄教授审阅、习题经曹玉蓉副教授审阅，提出了很多宝贵意见。在此对他们以及过去对本书提出过意见与建议的老师们表示由衷的谢意。

错误及不足之处，恳切希望读者批评指正。








酸性越强，其共轭碱的碱性越弱

越容易提供质子，共轭碱不容易回去接受质子

1. 酸性强弱

2. 碱性强弱



① 与H相连的键是否易断

② H断后剩下部分是否稳定

① 阴离子电负性越大，酸性越强（更易失 H^+ ）


② 诱导效应（成键原子电负性差异导致）



给电子诱导效应（烷基）

吸电子

-I（杂原子）





1996.7.





扫描全能王 创建

吸电子诱导



吸电子(诱导)



给电子

共振式不对称稳定性易与乙醚脱氢后的共振式

③原子半径↑ 酸性↑ 同一主族

$\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$ 半径↑, 对电子屏蔽能力↑ A-稳定性↑

2. 石碱性强弱

给电子基团增强碱性

④共振结构, 共振石碱性稳定性↑ 酸性↑

①是否容易给电子 碱性越强不易给电子, 石碱性↓

②共振, 酸自给电子稳定性/酸性强弱




③基团↑ 水中形成的氢键↓ 共振 石酸性稳定性↑ 石碱性↓

给电子

给电子基团↑ 给电子效应↑ 石碱性↑ 仲乙胺(碱性) > 乙胺(碱性)

三. 路易斯酸碱石碱理论

酸: 接受电子 碱: 给出电子



路易斯酸: 有空轨道, 表现为不足八电子的中性分子或阳离子

路易斯碱: 有电子, 表现为有孤对电子的中性分子或阴离子

亲电: 缺电子 阳离子或有空轨道

亲核试剂: 富电子的试剂 → 阴离子或有孤对电子的中性分子

亲核位点: 有电子的原子

所有路易斯石碱都是亲核试剂

(或给出电子的多重键)

强亲核性

弱亲核性

亲核性的本质是给电子能力与石碱性密切相关

同一周期的原子作为中心, 石碱性↑ 亲核性↑

同种元素的原子作为中心, 石碱性↑ 亲核性↑

空间位阻↑ 亲核性↓ $\text{CH}_3\text{O}^- > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^- > (\text{CH}_3)_2\text{CO}^- > (\text{CH}_3)_3\text{CO}^-$ 体积↑ 亲核性↓

亲核性与溶剂有关, 在质子溶剂(如水或醇), 亲核中心体积↑ 亲核性↑ $\text{RS}^- > \text{RO}^-$ $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$

不能与阴离子形成氢键的溶剂中, 亲核性顺序与石碱性一致 $\text{F}^- > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$


亲电试剂: 缺电子的试剂 → 阳离子或缺电子的中性分子(带δ+也可) AlCl_3

有空轨道


第三章 有机化学反应

键的断裂有均裂和异裂两种(均需一定外界条件) 均裂 → 离子型反应(前提为极性共价键)

1. 均裂 → 自由基反应 $\text{H}_3\text{C}-\text{H} \longrightarrow \text{H}_3\text{C}\cdot + \text{H}\cdot$



均裂生成自由基的反应叫作自由基反应







扫描全能王 创建

1982~1983, CRC Press, Inc. 其他一些摘自顾庆超等编. 化学用表. 江苏科学技术出版社 1979; Heilbron 等. Dictionary of Organic Compounds, 4th Ed; The Merck Index, 9th Ed 以及 [英]斯塔克 J G, 华莱士 H G 著. 化学数据手册. 杨厚昌译. 石油工业出版社, 1980 年版。

本书在编写过程中, 得到我校王积涛、唐士雄、刘靖疆、王长凤、曹玉蓉等老师的指导与帮助 由北京大学等十六所院校组成的审稿小组对修改稿提出了许多宝贵意见, 在此一并表示衷心的感谢。

限于编者水平, 错误之处, 恳切希望读者批评指正。






iso, neo 按排序, sec, tert 不参与

表示个数的前缀不用排序
di- tri- tetra-

Expanded formula Condensed formula 键线式 Carbon-skeleton formula

路易斯结构式
Lewis formula





3. 性质

物理性质 熔沸点随分子量增大而升高

有支链的比无支链的熔沸点低, 拉大了分子间距离

构型异构: C-C 键可任意旋转, 旋转后 C 上所连的原子(团)相对位置变化



需要能量, 但较少
Newman projection



交叉式构象最稳定
重叠式最不稳定

反应机理:





根据反应事实, 对反应过程的详细描述和理论解释

活化能: 发生反应所需要的最低能量 (反应物能量与过渡态能量差)

过渡态: 由反应物到产物之间的新键未完全形成, 旧键未完全断裂的能量最高的中间状态



活化能 ↑ 中间体稳定性 ↓ 反应越难进行



扫描全能王 创建

形成顺反异构的条件

(1) 分子中有限制 C-C 键旋转的因素 (C=C 或碳环)

(2) 每个双键 C 必须连接两个不同的原子或原子团


相同基团在同侧为顺式, 异侧为反式

若所有基团都不同, 也为顺反异构, 但无法给出顺反


2. 命名

① 选择含 C=C 的最长 C 链为主链 **阿拉伯**


② 编号从距 C=C 最近的一端开始, 并用数字表示双键位置




Hex-2-ene



2,4-Dimethylhex-3-ene



Z



E

Z/E 命名: 优先基团在同侧 Z, 优先基团在异侧 E

① 首先比较与主 C 链相连原子的原子序数, 原子序数大的优先基团

② 若与主链相连的原子相同, 则比较与该原子相连的原子, 依次外推 (不是加和)


③ 若取代基的一个原子以双键三键与其他原子相连, 则把它看作与该原子二次三次相连

3. 烯烃结构反应

有 π 键, π 电子易参与反应, 是电子供体, 有亲核性

烯烃加成反应 $\rightarrow$ π 键打开, 生成两个 C-R 键

一般不需要过高条件





Br-Br 键断裂生成 Br^+ 亲电试剂

双键上电子云密度 $\uparrow$ 加成反应速率 $\uparrow$

给电子基团数量 $\uparrow$

反应过程 (亲电加成)

第一步: 亲电试剂进攻双键, 反式加成




第一步

第一步后 C^+ 亲电, 与亲核 Br^- 结合

非对称烯烃主产物判断

通过中间体稳定性 (叔 > 仲 > 伯)

马氏规则 H^+ 在含 H 较多碳



主产物

超共轭与给电子基团反应使 2 号碳的 C^+ 更稳定, 其中间体更稳定



化热。1mol 不饱和烃氢化时所放出的热量
 氢化热越大, 不饱和烃越不稳定
 双键上存在的取代基越多, 烯烃越不稳定

2. 化学性质亲电加成
 $R-C\equiv CH + H-X \rightarrow R-C=CH-X$
 亲电加成
 $R-C\equiv CH + H-X \rightarrow R-C\equiv CH + H-X \rightarrow R-C=CH-X$
 亲电加成
 在空间上有所靠近
 有干燥亲电试剂

第五章 炔烃及二烯炔 $C_n H_{n-2}$

Ethyne C_2H_2 $CH\equiv CH$
 Propyne C_3H_4 $CH\equiv CCH_3$
 1-Butyne C_4H_6 $CH\equiv CCH_2CH_3$
 2-Butyne C_4H_6 $CH_3C\equiv CCH_3$
 1-Pentyne C_5H_8 $CH\equiv CCH_2CH_2CH_3$



4-Methyl-2-pentyne

1. 结构:

① 线性, 无顺反异构 ② C sp 杂化, 兀键较炔烃不易断
 第一章 绪论
 C 电负性高, C-H 键显极性

3. 酸性

$H_2O > ROH > HC\equiv CH > NH_3 > RH$ 强酸制弱酸
 炔烃无法制备水

可用强碱与炔反应以产生炔离子
 命名和异构
 炔共轭石成, 强碱成强亲核

有机化学的研究对象与任务	1	物理性质	
化学键与分子结构	2	化学性质	35
共价键的键参数	3	1. 加成反应	35
分子间的力	5	(1) 催化加氢	35
有机化合物的一般特点	6	(2) 与卤素加成	36
有机反应的基本类型	7	(3) 与卤化氢加成	37
研究有机化学的方法	8	(4) 与水加成	38
有机化合物的分类	9	(5) 与硫酸加成	38
习题	11	(6) 与次卤酸加成	39
		(7) 与烯烃加成	39
		(8) 硼氢化反应	40
		2. 氧化	40
		(1) 与高锰酸钾的反应	40
		(2) 臭氧化	41
		(3) 环氧乙烷的生成	41
		3. 聚合	41
		4. α -氢的卤化	42
		自然界的烯烃	42

第二章 饱和烃(烷烃)

同系列和同分异构	12
命名	14
烷烃的结构	17
乙烷和丁烷的构象	19
物理性质	22
化学性质	23
1. 氯化	23
2. 氧化和燃烧	27
自然界的烷烃	28

习题 28

第三章 不饱和烃


I. 烯烃

炔烷, 丙炔, 丙炔鉴定
 丙炔 $\xrightarrow{Br_2/CCl_4}$ 褪色
 丙炔 $\xrightarrow{KMnO_4}$ 褪色
 丙炔 $\xrightarrow{AgNO_3/NH_3}$ 无沉淀
 丙炔 $\xrightarrow{Cu(NH_2)Cl}$ 无沉淀

II. 炔烃

乙炔的结构	43
命名和异构	44
物理性质	44
化学性质	45





1. 加成反应	45	1. 卤化	低温1,2
(1) 催化氢化	45	2. 硝化	高温1,4
(2) 与卤化氢加成	46	3. 磺化	
(3) 与水加成	46	4. 傅氏反应	
(4) 与氢氰酸加成	46	苯环上取代基的定位规律(定位效应或称取向效应)	
2. 金属炔化物的生成	47	邻对位定位基(第一类定位基)	
III. 双烯烃	47	2. 间位定位基(第二类定位基)	
1,3-丁二烯的结构	47	定位规律与电子效应	
1,3-丁二烯的化学性质	48	1. 诱导效应	
1. 1,4-加成作用	48	2. 共轭效应	
2. 双烯合成反应	49	二、稠环芳香烃	
异戊二烯和橡胶	50	萘	
习题	51	1. 萘的取代反应举例	
第四章 环烃	54	2. 加氢	
I. 脂环烃	54	3. 氧化	
环烷的结构	56	蒽和菲	
环己烷及其衍生物的构象	57	致癌烃	
脂环烃的性质	58	石墨、C ₆₀ 与石墨烯	
1. 催化氢化	59	III. 煤焦油和石油	
2. 与溴的反应	59	习题	
金刚烷	60	第五章 旋光异构	
II. 芳香烃	60	偏振光和旋光活性	
芳香烃的分类及命名	61	比旋光度	
一、单环芳香烃	63	分子的对称性、手性与旋光活性	
苯的结构	63	含一个手性碳原子的化合物	
物理性质	65	构型的表示方法	
化学性质	66	费歇尔投影式	
1. 取代反应	66	含两个不相同手性碳原子的化合物	
(1) 卤化	66	含两个相同手性碳原子的化合物	
(2) 硝化	66	4-bromocyclohexene	
(3) 磺化	67	不含手性碳原子的化合物的旋光异构现象	
(4) 傅氏反应	67	2-chloro-4-methylpentane	
2. 加成反应	68	CH ₃ CHClCH ₂ CH ₃	
3. 氧化	68	3,3,5-trichloro-2-methylpentane	
4. 烷基侧链的卤化	69		
亲电取代反应的机理	69		

第六章: 卤代烃
 一. 命名:
 以母体的命名规则为准
 前缀: F: fluoro-
 Br: bromo-
 Cl: chloro-
 I: iodo-
 CH₃CHClCH₂CH₃
 2-chloro-4-methylpentane
 CH₃CHClCH₂CHClCH₃
 3,3,5-trichloro-2-methylpentane


结构：卤素相连的C为αC，带δ⁺，与卤素相连的C为βC，由诱导效应，带δ⁺。卤素以卤负离子形式离开，亲核取代中原子半径F<Cl<Br<I，I最容易反应，F最不容易。

消除反应：由于卤素-1诱导效应，使βC带δ⁺，βC-H键变弱，可在强碱或环状条件下脱去该H，进而脱去与αC相连的卤素X⁻，形成αC=βC。

卤素：卤素电负性：F>Cl>Br>I，原子半径：F<Cl<Br<I。


环状化合物的立体异构	93	第七章 光谱法在有机化学中的应用	117
旋光异构体的性质	94	一. 红外光谱	122
不对称合成，立体选择反应与立体专一反应	95	二. 紫外光谱	124
分子的手性性和前手性碳原子	98	三. 核磁共振谱	125
外消旋体的拆分	98	化学位移	128
化学分离法	98	自旋耦合，裂分	133
生物分离法	99	习题	103
柱层析法	100	第六章 卤代烃	103

命名	103	1. 亲核取代	103
物理性质	104	(1) 被羟基取代	106
化学性质	105	(2) 被烷氧基取代	106
1. 亲核取代反应	105	(3) 被氨基取代	106
(1) 被羟基取代	106	(4) 被羧基取代	106
(2) 被烷氧基取代	106	与金属的反应	107
(3) 被氨基取代	106	脂肪族亲核取代反应的机理	108
(4) 被羧基取代	106	1. 单分子机理	108
与金属的反应	107	2. 双分子机理	108
脂肪族亲核取代反应的机理	108	不同卤代烃对亲核取代反应的反应活性比较	109
1. 单分子机理	108	亲核取代反应的立体化学	110
2. 双分子机理	108	亲核取代与消除反应的关系	110
不同卤代烃对亲核取代反应的反应活性比较	109	多卤代烃的性质	111
亲核取代反应的立体化学	110	卤代烃的生理活性	111
亲核取代与消除反应的关系	110	重要代表物	113
多卤代烃的性质	111	1. 三氯甲烷	113
卤代烃的生理活性	111	2. 四氯化碳	113
重要代表物	113	3. 氯乙烯及聚氯乙烯	114
1. 三氯甲烷	113	4. 几种重要的含氟化合物	114
2. 四氯化碳	113	习题	114
3. 氯乙烯及聚氯乙烯	114		
4. 几种重要的含氟化合物	114		



E_1 与 SN_1 类似, E_2 与 SN_2 类似
 对于 E_2 , 叔C更易反应, PC上的H数目多, 叔C更易反应, 叔C更稳定
 倾向生成更稳定烯烃, 从含H较少的PC掉

有机化学(第五版)



C^+ 三种反应方式
 1. 直接与阴离子反应
 2. 先重排, 形成更稳定 C^+ , 再与阴离子反应
 3. 消除H, 形成重键取代产物

伯C主要发生 SN_2 , 在位阻大的情况下, 叔C更易反应

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

叔C主要发生 SN_1 , 低温下 SN_1 , 高温下 SN_2

碱性虽强, 高温易发生消除, 相反则取代

活性 17

芳香环的取代反应 17

歧化反应 17

亲核加成的立体化学 18

α, β -不饱和羰基化合物的亲核

加成 18

重要代表物 18

1. 甲醛 18

2. 乙醛及三氯乙醛 18

3. 丙酮 18

4. 苯甲醛 18

醛和酮的红外光谱 18

II. 醌 18

命名与结构 18

对苯醌的化学性质 18

1. 羰基的加成 18

2. 烯键的加成 18

3. 1,4-加成作用 18

4. 还原 18

自然界的醌 18

习题 18

第十章 羧酸及其衍生物 19

I. 羧酸 19

命名 19

物理性质 19

化学性质 19

1. 酸性 19

2. 羧基中羟基的取代反应 19

(1) 酸酐的生成 19

(2) 酰卤的生成 19

(3) 酯的生成 19

(4) 酰胺的生成 20

3. 还原 20

4. 烃基上的反应 20

(1) α -卤化作用 20

(2) 芳香环的取代反应 20

第九章 醛、酮、醌 167

I. 醛和酮 167

命名 168

物理性质 169

化学性质 171

1. 羰基上的加成反应 171

(1) 与氢氰酸的加成 171

(2) 与格氏试剂的加成 172

(3) 与氨的衍生物的加成缩合 172

(4) 与醇的加成 173

2. 还原 175

3. 氧化 175

4. 烃基上的反应 176



扫描全能王 创建

第七章 醇和醚

醇 官能团: 羟基 -OH

低级 alcohol -ol

CH₃OH Methanol

CH₃CH₂OH Ethanol

将烷烃中的 H 换成 -OH

选择羟基所连的碳链

编号时使羟基编号最小

2. 乙酸

3. 苯甲酸

4. 乙二酸

5. 丁二酸

6. 邻苯二甲酸

7. 对苯二甲酸

8. 萘-2,6-二羧酸

9. 蒽-9,10-二羧酸

10. 苯-1,3,5-三羧酸

11. 苯-1,3,4,5-四羧酸

12. 苯-1,2,3,4,5-五羧酸

13. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

14. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

15. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

16. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

17. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

18. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

19. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

20. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

21. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

22. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

23. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

24. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

25. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

26. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

27. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

28. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

29. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

30. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

31. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

32. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

33. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

34. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

35. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

36. 苯-1,2,3,4,5,6-六羧酸

1. 醇的分类命名

① 按与 -OH 相连的 C 的类型

CH₃CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH(OH)CH₃ 仲醇

CH₃C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH(OH)CH₂OH 伯醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₂ 叔醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C(OH)(CH₃)₃ 季醇

CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH 伯醇

② 按 OH 个数

一个 -OH 一元醇

二个 -OH 二元醇

三个 -OH 三元醇

四个 -OH 四元醇

五个 -OH 五元醇

六个 -OH 六元醇

七个 -OH 七元醇

八个 -OH 八元醇

九个 -OH 九元醇

十个 -OH 十元醇

十一个 -OH 十一元醇

十二个 -OH 十二元醇

十三个 -OH 十三元醇

十四个 -OH 十四元醇

十五个 -OH 十五元醇

十六个 -OH 十六元醇

十七个 -OH 十七元醇

十八个 -OH 十八元醇

十九个 -OH 十九元醇

二十个 -OH 二十元醇

二十一个 -OH 二十一元醇

二十二个 -OH 二十二元醇

二十三个 -OH 二十三元醇

二十四个 -OH 二十四元醇

二十五个 -OH 二十五元醇

二十六个 -OH 二十六元醇

二十七个 -OH 二十七元醇

二十八个 -OH 二十八元醇

二十九个 -OH 二十九元醇

三十个 -OH 三十元醇

三十一个 -OH 三十一元醇

三十二个 -OH 三十二元醇

三十三个 -OH 三十三元醇

三十四个 -OH 三十四元醇

三十五个 -OH 三十五元醇

三十六个 -OH 三十六元醇

三十七个 -OH 三十七元醇

三十八个 -OH 三十八元醇

三十九个 -OH 三十九元醇

四十个 -OH 四十元醇

四十一个 -OH 四十一元醇

含 O 官能团优先以 O 命名

含 N 官能团优先以 N 命名

含 S 官能团优先以 S 命名

含 P 官能团优先以 P 命名

含 B 官能团优先以 B 命名

含 Si 官能团优先以 Si 命名

含 Ge 官能团优先以 Ge 命名

含 As 官能团优先以 As 命名

含 Sb 官能团优先以 Sb 命名

含 Sn 官能团优先以 Sn 命名

含 Pb 官能团优先以 Pb 命名

含 Bi 官能团优先以 Bi 命名

含 Po 官能团优先以 Po 命名

含 At 官能团优先以 At 命名

含 Rn 官能团优先以 Rn 命名

含 Ac 官能团优先以 Ac 命名

含 Sc 官能团优先以 Sc 命名

含 Ti 官能团优先以 Ti 命名

含 V 官能团优先以 V 命名

含 Cr 官能团优先以 Cr 命名

含 Mn 官能团优先以 Mn 命名

含 Fe 官能团优先以 Fe 命名

含 Co 官能团优先以 Co 命名

含 Ni 官能团优先以 Ni 命名

含 Cu 官能团优先以 Cu 命名

含 Zn 官能团优先以 Zn 命名

含 Ga 官能团优先以 Ga 命名

含 Ge 官能团优先以 Ge 命名

含 As 官能团优先以 As 命名

含 Sb 官能团优先以 Sb 命名

含 Sn 官能团优先以 Sn 命名

含 Pb 官能团优先以 Pb 命名

含 Bi 官能团优先以 Bi 命名

含 Po 官能团优先以 Po 命名

含 At 官能团优先以 At 命名

含 Rn 官能团优先以 Rn 命名

含 Ac 官能团优先以 Ac 命名

含 Sc 官能团优先以 Sc 命名

含 Ti 官能团优先以 Ti 命名

I. 醇的结构

II. 羧酸的衍生物

命名

物理性质

化学性质

1. 水解

2. 醇解

3. 酯化

4. 酯缩合反应

5. 与格氏试剂反应

6. 酰胺的酸碱性

自然界的羧酸衍生物

羧酸及其衍生物的红外光谱

III. 碳酸的衍生物

1. 光气

2. 尿素

3. 胍

习题

第十一章 取代酸

I. 羟基酸

一、醇酸

物理性质

化学性质

1. 酸性

2. α-羟基酸的氧化

3. α-羟基酸的分解反应

4. 失水反应

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸

羧酸


羧酸

羧酸

羧酸

羧酸





3. D-果糖	291	多肽	314
4. D-半乳糖	291	多肽结构的测定	316
5. D-甘露糖	292	1. 2,4-二硝基氟苯法	316
6. 维生素C	292	2. 异硫氰酸酯法	316
7. 氨基己糖	292	多肽的合成	317
II. 糖苷	293	蛋白质	319
III. 双糖	295	习题	321
还原性双糖	296		
1. 麦芽糖和纤维二糖	296		
2. 乳糖	297		

1. 麦芽糖和纤维二糖	296	第十六章 类脂化合物	323
2. 乳糖	297	I. 油脂	323

非还原性双糖	297	物理性质	325
IV. 多糖	298	化学性质	326
1. 淀粉	298	皂化	326
2. 糖原	301	2. 加成	326

纤维素	301	1. 氢化	327
4. 半纤维素	302	2. 加碘	327
习题	302		

第十五章 氨基酸、多肽与蛋白质	306	II. 肥皂及合成表面活性剂	327
I. 氨基酸	306	肥皂的组成及乳化作用	327
氨基酸的构型	308	合成表面活性剂举例	328

物理性质	308	1. 阴离子型表面活性剂	328
化学性质	308	2. 阳离子型表面活性剂	329
1. 两性	309	3. 非离子型表面活性剂	329

2. 与亚硝酸的作用	310	III. 蜡	330
3. 与甲醛作用	310	IV. 磷脂	330
4. 络合性能	310	V. 萜类化合物	332

5. 氨基酸的受热反应	310	单萜	333
6. 茚三酮反应	311	无链萜	333
7. 失羧作用	311	单环萜	334

8. 失羧和失氨作用	312	3. 双环萜	334
个别α-氨基酸	312	倍半萜	336
1. 甘氨酸	312	二萜	337

2. 半胱氨酸和胱氨酸	313	三萜	338
3. 色氨酸	313	四萜	339
4. 谷氨酸	313	甾族化合物	340


5. 蛋氨酸	313	胆固醇	342
--------	-----	-----	-----

1. 甘氨酸	312		
2. 半胱氨酸和胱氨酸	313		
3. 色氨酸	313		

4. 谷氨酸	313		
5. 蛋氨酸	313		

--	--	--	--

--	--	--	--



7. 脱氢胆固醇、麦角固醇和胆酸 $30^\circ C$ 342

8. 甾族激素 343

(1) 肾上腺皮质激素 344

(2) 性激素 $C_{17}H_{34}O$ 344

5. 强心苷、蟾毒与皂角苷 $10-100^\circ C$ 345

1. 烟碱 361

4. 维生素 B₁ 361

5. 吡啶及 β -吡啶乙酸 361

6. 花色素 361

7. 嘌呤及核酸 361

8. 维生素 B₂ 及叶酸 361

生物碱 361

1. 烟碱 361

4. 金鸡纳碱 361

5. 喜树碱 361

6. 吗啡碱 361

7. 小檗碱 361

8. 咖啡碱 361

第十七章 杂环化合物

分类和命名 351

1. 五元杂环 352

2. 六元杂环 353

3. 稠杂环 353

习题 371

羟基活化基团

几种重要杂环化合物的性质 353

1. 呋喃、噻吩、吡咯、吡啶的结构 353

2. 呋喃、噻吩、吡咯、吡啶的性质 354

3. 亲电取代反应 354

4. 氧化 354

5. 还原 354

6. 吡咯及吡啶的碱性 355

与生物有关的杂环及其衍生物 356

1. 呋喃及 α -呋喃甲醛 356

2. 吡咯、叶绿素、血红素及维生素 B₁₂ 357

3. 吡啶、辅酶素 P₁、维生素 B₆ 357

量子力学与原子轨道 371

共价键的理论 371

1. 价键法 371

2. 分子轨道法 371

(1) 乙烯 371


(2) 1,3-丁二烯 371

(3) 苯 371

分子轨道对称性与协同反应的关系 371

部分习题参考答案或提示 381

索引 391



第九章：酚——羟基直接与苯环相连
环氧——成环且有O参与

酚：相比 $R-OH$ ， $O-H$ 更易断裂，苯环为吸电子基团且共轭成体系，稳定性更强 酸性 酚 > 水 > 醇
酸性↑ 稳定性↓ 亲核性↓
 $C-O$ 可形成 $p-\pi$ 共轭，较难断裂

环氧的命名

2

ethylene oxide

tetrahydrofuran

1,4-dioxane

条核试剂从背面进攻,在酸性条件下开环形成三元环中,如果有一个叔C,则更易被亲核试剂进攻(受电子效应影响大,控制)而如果是伯C与仲C,则更倾向于伯C,叔C更稳定,叔C使其共轭

离技术及实验物理学的发展,为分离、提纯及结构测定提供了许多快速、有效而准确的方法。物理有机化学研究是有机化学研究中的另一项重要任务,也就是研究有机化合物结构与性质间的关系、反应过程的途径和影响反应的因素等,以便控制反应向人们需要的方向进行。

有机化学研究第三项任务便是,在确定了分子结构并对许多有机化合物的反应有相当了解的基础上,以由石油或煤焦油中取得的许多简单有机化合物为原料,通过各种反应,合成人们所需要的自然界存在的,或自然界不存在的全新的有机化合物,如维生素、药物、香料、食品添加剂、染料、农药、塑料、合成纤维和合成橡胶等各种工农业生产和人民生活的必需品。

组成生物体的物质除了水和种类不多的无机盐以外绝大部分是有机化合物,它们在生物体中有着各种不同的功能。例如,构成动植物结构组织的蛋白质与纤维素;植物及动物体中储藏的养分——淀粉、肝糖、油脂;使花、叶及昆虫翅膀呈现各种鲜艳颜色的物质;花或水果的香气;黄鼠狼放出的臭气;葱、蒜的特殊气味;昆虫之间传递信息的物质,等等。

生物的生长过程实际上是无数的有机分子的合成与分解的过程,正是这些连续不断并互相依赖的化学变化构成了生命现象。生物体中进行的许许多多化学变化与实验室中进行的有机反应在一定程度上有其相似性,所不同的是催化生化反应的是结构极为复杂的蛋白质——酶。所以有机化学的理论与方法,是研究生物学的必要基础。只有对组成生物体的物质分子的结构和化学变化有所了解,才能弄清生物过程的机理。至今几乎所有生物化学的重要突破,都包含了大量化学、物理学等方面的研究工作。例如,作为生命现象物质基础的蛋白质,是结构极为复杂的有机高分子化合物,随着物理学、化学等多种学科的发展成就,对核酸、蛋白质等复杂分子的结构有了相当的认识,并且了解到核酸及蛋白质在遗传信息传递的控制,各种不同的酶在机体中的专一作用等,都与它们的结构密切相关。彻底揭开蛋白质结构的奥秘,将对生物学的研究有着极为重要的意义。因此,研究有机化学的深远意义之一在于研究生物体及生命现象。

已位键

官能团容易发生化学反应,在反应中活泼

化学键与分子结构

影响化学键断裂

① 电负性差值 ΔEN
② 原子半径

讨论分子结构就是讨论原子如何结合成分子、原子的连接顺序、分子的大小及立体形状,以及电子在分子中的分布等问题。首先涉及的就是将原子结合在一起的电子的作用,即化学键。

化学键的两种基本类型,就是离子键与共价键,离子键是由原子间电子的转移形成的,共价键则是原子间共用电子形成的。

无机物大部分是以离子键形成的化合物。如氯化钠是典型的离子化合物,在氯化钠晶体中,每一个钠离子被六个氯离子包围,同样,每一个氯离子又被六个钠离子包围着。“NaCl”这个式子,只代表在晶体中有等量的正离子(Na^+)及负离子(Cl^-)。

有机分子中的原子主要是以共价键相结合的。一般说来,原子核外未成对的电子数,也就是该原子可能形成的共价键的数目。例如,氢原子外层只有一个未成对的电子,所以它只能与另一个氢原子或其他一价的原子结合形成双原子分子,而不可能再与第二个原子结合,这就是共价键有饱和性。

量子力学的价键理论认为,共价键是由参与成键原子的电子云重叠形成的,电子云重叠越多,则形成的共价键越稳定,因此电子云必须在各自密度最大的方向上重叠,这就决定了共价键



扫描全能王 创建

碱性条件下...
控制阻小的C

分子结构(构造): 分子中原子相互结合的次序和方式

有方向性。

5.18 期末

共价键的饱和性和方向性决定了每一个有机分子都是由一定数目的某几种元素的原子按特定的方式结合形成的,所以它们不同于氯化钠晶体,每一个有机分子都有其特定的大小及立体形状。分子的立体形状与分子的物理性质、化学性质都有很密切的关系,尤其是生理活性,分子在立体形状上的微小差异,常能给生理活性带来极大的影响。有机化合物中的立体化学是近代有机化学的重要研究课题之一。

相同元素的原子间形成的共价键没有极性。不同元素的原子间形成的共价键,由于共用电子对偏向于电负性较强的元素的原子而具有极性。

结构决定性质

性质反映结构

C-C, C-H 键均认为是 共价键的键参数

非极性键, 较稳定

电负性差值大于 0.5 或 0.7 的, 认为是极性分子

C-Br ($\Delta EN = 0.3$ 但 Br 半径大, 电子云变形) 也认为是极性键

在描述以共价键形成的分子时,常要用到键长、键角、键能、键的极性等表征共价键性质的物理量,叫作共价键的键参数。

(1) 键长 两个原子形成共价键,是由于两个原子借助原子核对共用电子对的吸引而联系在一起,但两个原子核之间还有很强的斥力,使两原子核不能无限靠近,而保持一定的距离。实际上成键的吸引力与核间的斥力是相互竞争的,这就使得两核之间的距离有时较远,有时较近,这种变化叫作键的伸缩振动。键长是两核之间最远与最近距离的平均值,或者说是两核之间的平衡距离。同一种键,在不同化合物中,其键长的差别是很小的。例如, C—C 键在丙烷中为 0.154 nm,在环己烷中为 0.153 nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)。

(2) 键角 分子中某一原子与另外两个原子形成的两个共价键在空间形成的夹角叫作键角。键长与键角决定着分子的立体形状。由图 1-1 可看出,在不同化合物中由相同原子形成的键角不一定完全相同,这是由于分子中各原子或基团相互影响所致。




图 1-1 某些分子中的键角

(3) 键能 原子结合成稳定的分子时要放出能量;相反的,如果将分子拆开成原子,则必须给以相同的能量。以双原子分子 AB 为例,将 1 mol 气态的 AB 拆开成气态的 A·及 B·所需的能量,叫作 A—B 键的解离能,通常就叫作键能。但对于多原子分子来说,键能与键的解离能是不同的。例如,将 1 mol 甲烷分解为 4 个氢原子及 1 个碳原子,亦即打开 4 个 C—H 键,需要吸收

磷





第十章：含N化合物

RNH_2 R_2NH R_3N 与C无关看与N相连的R基个数
伯胺 仲胺 叔胺

H被脂肪烃取代 → 脂肪胺


H被芳基取代，N与基直接相连 → 芳香胺





↑
+C - I
N使苯环电子密度
增大，自电子密度↓
亲核性↓
碱性↓




表示取代基连在N上



脂肪胺N上有一对孤对电子



反应



碱性 $RNH_2 > NH_3$

原因 ① R给电子可使N电子云密度↑

② R给电子可分散 RNH_3^+ 中正电荷


仲胺 > 伯胺 > 叔胺 空间位阻效应

溶剂化效应影响 共轭 酸稳定性

H_2O 中 O 上孤对电子可以外部稳定 N^+






R基↑ 溶剂化效应↓ 共轭酸稳定性↓

若在空气中，无溶剂化效应，则叔胺最强
连的芳基↑ 碱性↓ 吸电子、空间位阻、溶剂化
碱性





杂化类型不同， sp^3 电负性小， sp 大， sp^3 碱性↑


第十一章：醛与酮




Cyclohexane carbaldehyde



西同璽易被核試劑進攻





反应容易程度




亲核试剂亲核性↑越易反应


溶剂化效应



✓ 此 H 为 N 上的
此 H 为原来的 H



扫描全能王 创建



醛、酮与烯醇互式易发生互变异构

↑ 醛基与酮基互变异构
这反映了个平衡移动原理
这反映了个平衡移动原理

如：在酸性条件下，醛基与酮基互变异构，生成烯醇式结构，因
(+H) 反应 (HCl 反应)

在碱性条件下，醛基与酮基互变异构，生成烯醇式结构，因
(-H) 反应 (OH⁻ 反应)

